MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES


SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

PARC NATUREL MARIN

ESTUAIRE DE LA GIRONDE MER DES PERTUIS




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 9269 déchets

Abondance médiane : 353 déchets/100 m


Abondance moyenne : 463 déchets/100 m



COMPOSITION ET PRINCIPAUX GROUPES hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets

Pourcentage du total de déchets



Principaux groupes de déchets

Plastiques à usage unique	Déchets réseaux assainissement	Fragments en plastique (> 2,5 cm)
1807 déchets	*410 déchets*	*4632 fragments*
19%	4%	50%
Médiane : 108 déchets/100 m	**Médiane : 19 déchets/100 m**	**Médiane : 144 déchets/100 m**
Moyenne : 90 déchets/100 m	Moyenne : 21 déchets/100 m	Moyenne : 232 déchets/100 m

TOP10 hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)


- *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)* — *2656 (28,7%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)* — *1163 (12,6%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)* — *459 (5%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (> 50 cm)* — *339 (3,7%)*
- *[VER] fragments non-identifiés en verre (≥ 2,5 cm)* — *325 (3,5%)*
- *[PLAST] emballages de confiserie et paquets de chips* — *295 (3,2%)*
- *[PLAST] emballages alimentaires identifiés autres (hors confiserie et chips)* — *281 (3%)*
- *[PLAST] bouchons et couvercles pour boissons (incl. alimentaires)* — *274 (3%)*
- *[PLAST] contenants, tubes et emballages médicaux et pharmaceutiques* — *173 (1,9%)*
- *[PLAST] bâtonnets de coton-tige en plastique* — *172 (1,9%)*

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 8953,46428571428 frag

Abondance médiane : 103 fragments/100 m

Abondance moyenne : 448 fragments/100 m




POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 5 boulettes

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

Répartition sur l'année >



Paraffines et assimilés
Hydrocarbures
Autres polluants

MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

SYNTHÈSE

2025

Analyse réalisée par le CEDRE


Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

PARC NATUREL MARIN

Parcs naturels marins

PNM EPMO | PNM I | PNM EGMP | PNM BA | PNM GL




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 14698 déchets

Abondance médiane : 207 déchets/100 m


Abondance moyenne : 320 déchets/100 m



COMPOSITION ET PRINCIPAUX GROUPES hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets

Pourcentage du total de déchets



Principaux groupes de déchets

Plastiques à usage unique	Réseau d'assainissement	Fragments en plastique (> 2,5 cm)
3649 déchets	*657 déchets*	*6403 fragments*
25%	4%	44%
Médiane : 91 déchets/100 m	**Médiane : 16 déchets/100 m**	**Médiane : 87 déchets/100 m**
Moyenne : 97 déchets/100 m	Moyenne : 18 déchets/100 m	Moyenne : 115 déchets/100 m

TOP10 hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)

- *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)* — *3497 (23,8%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)* — *1483 (10,1%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)* — *1060 (7,2%)*
- *[PLAST] emballages de confiserie et paquets de chips* — *1019 (6,9%)*
- *[PLAST] emballages alimentaires identifiés (hors confiserie et chips)* — *446 (3%)*
- *[PLAST] bouchons et couvercles pour boissons (incl. alimentaires)* — *404 (2,8%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (> 50 cm)* — *342 (2,3%)*
- *[VER] fragments non-identifiés en verre (≥ 2,5 cm)* — *325 (2,2%)*
- *[PLAST] mousse isolante incluant mousse pulvérisée* — *259 (1,8%)*
- *[PLAST] bâtonnets de sucette et de glace en plastique* — *226 (1,5%)*

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Abondance médiane : 33 fragments/100 m

Abondance moyenne : 244 fragments/100 m



PNM EPMO | PNM I | PNM EGMP | PNM BA | PNM GL

POLLUANTS CHIMIQUES

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **conditions hydrologiques mensuelles**

DESCRIPTIF DU SITE

LA SOUBISE (Soubise, 17)

DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne (sud)
Bassin Hydrographique : Adour-Garonne
Fleuve : la Charente

Suivi réalisé par T.E.O.
(fréquence trimestrielle)

Site situé en aval de Rochefort, rive nord de la Charente. Berge naturelle à pente douce (ancienne zone de débarquement). La zone intertidale inférieure est composée de substrat vaseux. Le haut de la berge est fixé par une langue de végétation. En arrière du bourrelet le terrain est plat, composé de matériaux grossiers et de végétation herbacées jusqu'au chemin de halage. Propriété du Conservatoire du Littoral, zone Natura 2000, ZPS, ZNIEFF et SICO. Site non accessible en période de nidification.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 429 déchets

Abondance médiane : 89 déchets/100 m


Abondance moyenne : 107 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Soubise, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Soubise, 2025)

Pourcentage du total de déchets ; Nombre de déchets collectés



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Soubise, 2025)




Saison 1 : Vent à 25 km/h orienté SO.
Saison 2 : Vent à 42 km/h orienté E.
Saison 3 : Absence de vent. Beaucoup de végétations limitant la visibilité de possibles déchets.
Saison 4 : Vent à 12 km/h orienté SE.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 45 fragments


Abondance médiane : 12 fragments/100 m

Abondance moyenne : 11 fragments/100 m



CONDITIONS HYDROLOGIQUES MENSUELLES

Débit en m³/s (colonnes bleues ou hachures grises si données non disponibles), pluie en mm (courbe orange) et abondance de déchets/100 m (triangles verts)



MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **conditions hydrologiques mensuelles**

DESCRIPTIF DU SITE

L'ERMITAGE (Lormont, 33)

DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne (sud)
Bassin Hydrographique: Adour-Garonne
Fleuve : la Garonne

Suivi réalisé par Wings of the Ocean (fréquence trimestrielle)

En attente des éléments de l'opérateur




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 2923 déchets

Abondance médiane : 868 déchets/100 m


Abondance moyenne : 913 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (L'Ermitage, 2025)

Pourcentage du total de déchets



Top 5 des déchets les plus abondants (L'Ermitage, 2025)

Pourcentage du total de déchets ; Nombre de déchets collectés

[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)
29,3% — 1 070

[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)
13,0% — 476


[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (> 50 cm)
9,2% — 336

[VER] fragments non-identifiés en verre (≥ 2,5 cm)
6,7% — 244

[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)
2,8% — 104

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (L'Ermitage, 2025)




Saison 1 : Absence de vent. Pas de commentaire.
Saison 2 : Pas de commentaire.
Saison 3 : Absence de vent. Pas de commentaire.
Saison 4 : Absence de vent. Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 1650 fragments


Abondance médiane : 324 fragments/100 m

Abondance moyenne : 413 fragments/100 m



CONDITIONS HYDROLOGIQUES MENSUELLES

Débit en m³/s (colonnes bleues ou hachures grises si données non disponibles), pluie en mm (courbe orange) et abondance de déchets/100 m (triangles verts)



MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **conditions hydrologiques mensuelles**

DESCRIPTIF DU SITE

PLAGNE (Saint-André-de-Cubzac, 33)

DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne (sud)
Bassin Hydrographique : Adour-Garonne
Fleuve : La Dordogne

Suivi réalisé par Wings of the Ocean (fréquence trimestrielle)

Berge naturelle en pente forte. Le site est localisé sur la rive droite de la Dordogne, commune de Saint-André-de-Cubzac. En pied de berge, le substrat est vaseux. La crête et l'arrière talus remontant à pente douce sont stabilisés par de la végétation principalement arbustive, jusqu'à une butte également végétalisée. Présence d'un carrelet sur le site. Site en zone Natura 2000 classé (ZCS) et ZNIEFF II.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1784 déchets

Abondance médiane : 353 déchets/100 m


Abondance moyenne : 446 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (Plagne, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Plagne, 2025)

Pourcentage du total de déchets ; Nombre de déchets collectés

[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm) — 22,4% — 400
[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm) — 12,4% — 222
[PLAST] emballages alimentaires identifiés autres — 8,5% — 151
[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm) — 7,8% — 140
[PLAST] bouchons et couvercles pour boissons (incl. alimentaires) — 5,3% — 94

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Plagne, 2025)




Saison 1 : Pas de commentaire.
Saison 2 : Pas de commentaire.
Saison 3 : Pas de commentaire.
Saison 4 : Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 391 fragments


Abondance médiane : 103 fragments/100 m

Abondance moyenne : 98 fragments/100 m



CONDITIONS HYDROLOGIQUES MENSUELLES

Débit en m³/s (colonnes bleues ou hachures grises si données non disponibles), pluie en mm (courbe orange) et abondance de déchets/100 m (triangles verts)



MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **conditions hydrologiques mensuelles**

DESCRIPTIF DU SITE

PORT CONAC (Saint-Sorlin-de-Conac, 17)

DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne (sud)
Bassin Hydrographique: Adour-Garonne
Fleuve : la Gironde

Suivi réalisé par l'association Environat (fréquence trimestrielle)

Berge artificielle. Le site positionné sur la rive nord de la Gironde. La zone intertidale est assez large, de pente douce, vaseuse et végétalisée. Ensuite, la berge se stabilise, et se compose de sédiments plus grossiers. Le haut de la berge est délimité par un talus enroché (bloc décimétrique), au dénivelé important. Un sentier pédestre menant à un village nature passe sur le sommet du talus. Présence de carrelets de part et d'autre du site. Zone Natura 2000 (ZSC).






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 798 déchets

Abondance médiane : 206 déchets/100 m


Abondance moyenne : 200 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (Port Conac, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Port Conac, 2025)

Pourcentage du total de déchets ; Nombre de déchets collectés

1. *[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)* — 17,3% — 138
2. *[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)* — 16,6% — 133
3. *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)* — 13,8% — 111
4. *[PLAST] emballages de confiserie et paquets de chips* — 5,9% — 47
5. *[PLAST] bouchons et couvercles pour boissons (incl. alimentaires)* — 3,3% — 27

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Port Conac, 2025)




Saison 1 : Absence de vent. Les premiers épisodes tempétueux de l'hiver ont ramené beaucoup de déchets sur le site.
Saison 2 : Absence de vent. Période météorologique calme, pas de crue dans les jours précédents.
Saison 3 : Absence de vent. Pas de commentaire.
Saison 4 : Vent à 10 km/h orienté sud-ouest. Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 121 fragments


Abondance médiane : 24 fragments/100 m

Abondance moyenne : 30 fragments/100 m



CONDITIONS HYDROLOGIQUES MENSUELLES

Débit en m³/s (colonnes bleues ou hachures grises si données non disponibles), pluie en mm (courbe orange) et abondance de déchets/100 m (triangles verts)



MACRODÉCHETS ISSUS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

SYNTHÈSE 2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-BH 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **conditions hydrologiques mensuelles**

DESCRIPTIF DU SITE

TERMINAL DE BLANQUEFORT / PAREMPUYRE (Parempuyre, 33)

DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne (sud)
Bassin Hydrographique : Adour-Garonne
Fleuve : La Garonne

Suivi réalisé par le CPIE Médoc (fréquence trimestrielle)

Berge semi-naturelle en pente forte. Le site est localisé sur un terrain propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux, sur la rive convexe d'un long méandre de la Garonne (rive gauche). Pente forte en pied de berge constituée d'un substrat vaseux. La crête et l'arrière talus remontant à pente douce sont stabilisés par de la végétation principalement herbacée et arbustive. Présence de blocs sur le site (ancien enrochement). L'arrière de la berge se caractérise par une butte à pente forte, derrière laquelle se trouve un chemin pédestre. Zone Natura 2000 classé (ZCS).






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1823 déchets

Abondance médiane : 689 déchets/100 m


Abondance moyenne : 651 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (Terminal de Blanquefort / Parempuyre, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Terminal de Blanquefort / Parempuyre, 2025)

Pourcentage du total de déchets ; Nombre de déchets collectés

1. *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)* — 39,7% — 1 033
2. *[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)* — 9,8% — 254
3. *[PLAST] contenants alimentaires en polystyrène moussé* — 4,9% — 127
4. *[PLAST] mousse isolante incluant mousse pulvérisée* — 4,7% — 121
5. *[PLAST] emballages de confiserie et paquets de chips* — 3,5% — 91

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Terminal de Blanquefort / Parempuyre, 2025)




Saison 1 : Vent à 15 km/h SSO. Episodes tempétueux les jours précédents le prélèvement.
Saison 2 : Vent à 8 km/h ENE. Pas de commentaire.
Saison 3 : Vent faible. Pas de commentaire.
Saison 4 : Vent faible. Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 866 fragments

Abondance médiane : 201 fragments/100 m

Abondance moyenne : 216 fragments/100 m



CONDITIONS HYDROLOGIQUES MENSUELLES

Débit en m³/s (colonnes bleues ou hachures grises si données non disponibles), pluie en mm (courbe orange) et abondance de déchets/100 m (triangles verts)

