MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL


SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

PARC NATUREL MARIN

ESTUAIRE DE LA GIRONDE MER DES PERTUIS




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 13207 déchets

Abondance médiane : 209 déchets/100 m


Abondance moyenne : 304 déchets/100 m



COMPOSITION ET PRINCIPAUX GROUPES hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets

Pourcentage du total de déchets



Principaux groupes de déchets

Plastiques à usage unique
1437 déchets
11%
Médiane : 18 déchets/100 m
Moyenne : 33 déchets/100 m

Pêche et Aquaculture
3582 déchets
12%
27%
15%
Médiane : 47 déchets/100 m
Moyenne : 83 déchets/100 m

Fragments en plastique (> 2,5 cm)
4512 fragments
34%
Médiane : 47 déchets/100 m
Moyenne : 103 déchets/100 m

TOP10 hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)


1. *[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)* — *2757 (20,9%)*
2. *[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)* — *1348 (10,2%)*
3. *[PLAST] ostréiculture hors collecteurs à naissains (incl. liens de fermeture)* — *597 (4,5%)*
4. *[PLAST] ficelles et cordages (diamètre < 1 cm) provenant de la pêche* — *579 (4,4%)*
5. *[PLAST] mytiliculture hors tahitiennes (filets/poches/liens de fermeture)* — *569 (4,3%)*
6. *[PLAST] collecteurs à naissains (plat, rond, etc.) pour ostréiculture* — *559 (4,2%)*
7. *[PLAST] emballages de confiserie et paquets de chips* — *487 (3,7%)*
8. *[PLAST] filets et morceaux de filets (2,5 cm - 50 cm)* — *483 (3,7%)*
9. *[VER] bouteilles de verre (incl. fragments)* — *474 (3,6%)*
10. *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)* — *369 (2,8%)*

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 2182 fragments

Abondance médiane : 5 fragments/100 m

Abondance moyenne : 50 fragments/100 m




POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 156 boulettes

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0,04 boulette/m

Répartition sur l'année >



Paraffines et assimilés
Hydrocarbures
Autres polluants

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.


PARC NATUREL MARIN

Estuaires picards Mer d'Opale · Iroise · Estuaire de la Gironde Mer des Pertuis · Bassin d'Arcachon · Golfe du Lion · Cap Corse Agriate · Mayotte · Martinique

Parcs naturels marins

PNM EPMO · PNM I · PNM EGMP · PNM BA · PNM GL · PNM CCA · PNM Mayotte · PNM Martinique

Abondances médianes des parcs




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 42003 déchets

Abondance médiane : 167 déchets/100 m




COMPOSITION ET PRINCIPAUX GROUPES

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets

Pourcentage du total de déchets



Principaux groupes de déchets

Plastiques à usage unique
6979 déchets
17%
Médiane : 24 déchets/100 m
Moyenne : 64 déchets/100 m

Pêche et Aquaculture
6757 déchets
16%
10%
6%
Médiane : 17 déchets/100 m
Moyenne : 41 déchets/100 m

Fragments en plastique (> 2,5 cm)
445 fragments
35%
Médiane : 43 déchets/100 m
Moyenne : 129 déchets/100 m

TOP10

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)

- *[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)* — *8922 (21,2%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)* — *3456 (8,2%)*
- *[PLAST] bouchons et couvercles pour produits non alimentaires* — *2081 (5%)*
- *[PLAST] bouchons et couvercles pour boissons (incl. alimentaires)* — *2016 (4,8%)*
- *[PLAST] filets et morceaux de filets (2,5 cm - 50 cm)* — *1563 (3,7%)*
- *[PLAST] ficelles et cordages (diamètre < 1 cm) provenant de la pêche* — *1436 (3,4%)*
- *[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)* — *1377 (3,3%)*
- *[PLAST] bâtonnets de coton-tige en plastique* — *1116 (2,7%)*
- *[PLAST] ostréiculture hors collecteurs à naissains (sacs/poches incl. liens de fermeture)* — *885 (2,1%)*
- *[PLAST] mousse isolante incluant mousse pulvérisée* — *877 (2,1%)*

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Abondance médiane : 5 fragments/100 m

Abondance moyenne : 32 fragments/100 m



PNM EPMO · PNM I · PNM EGMP · PNM BA · PNM GL · PNM CCA · PNM Mayotte · PNM Martinique

POLLUANTS CHIMIQUES

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0,01 boulette/m

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LA BAIE DE GATSEAU (Saint-Trojan-les-Bains, 17)

ID FR040
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2018 par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) (fréquence trimestrielle)

Plage en arrière d'une flèche sableuse fuyant un massif dunaire. Site en zone naturelle, classé ZNIEFF (types I et II) et SIC (Natura 2000).






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 567 déchets

Abondance médiane : 75 déchets/100 m


Abondance moyenne : 144 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Baie de Gatseau, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Baie de Gatseau, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Baie de Gatseau, 2025)




Saison 1 : Coef marée 86, vent NE 12 km/h.
Saison 2 : Beaucoup de vent avec un recouvrement de nombreux déchets à peine visibles. Énorme laisse de mer avec beaucoup de déchets dedans (difficiles à prélever).
Saison 3 : Coef de marée 80, vent O 20 km/h. Pas de commentaire.
Saison 4 : Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 40 fragments

Abondance médiane : 8 fragments/100 m

Abondance moyenne : 10 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 1 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m



MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE

2025

macrodéchets | fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm | polluants chimiques

DESCRIPTIF DU SITE

LA BAIE DE TALMONT






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

Total de déchets collectés et analysés : 3705 déchets


Abondance médiane : 784 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS

Composition des déchets (La Baie de Talmont, 2025)

Pourcentage du total de déchets



Top 5 des déchets les plus abondants (La Baie de Talmont, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)

[PLAST] fragments non-identifiés de films plastique (2,5 cm - 50 cm)
2277 (61,5%)

[PLAST] emballages de confiserie et paquets de chips
277 (7,5%)


[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)
178 (4,8%)

[VER] fragments non-identifiés en verre (≥ 2,5 cm)
131 (3,5%)

[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)
65 (1,8%)

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON


Abondances totales par suivi (La Baie de Talmont, 2025)



FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 891 fragments

Abondance médiane : 136 fragments/100 m




POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 147 boulettes

Abondance médiane : 0,29 boulette/m

Répartition sur l'année



MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LA BONNE ANSE (Saint-Augustin, 17)

ID FR054
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2021 par le Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (fréquence trimestrielle)

Plage de sable situé sur la flèche de Bonne Anse (pointe de la Coubre). Site bordé par une dune. En arrière de la fèche s'est formée la baie de Bonne Anse. Site en zone naturelle, classé ZNIEFF (type II), SIC et ZPS (Natura 2000).






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1183 déchets

Abondance médiane : 287 déchets/100 m


Abondance moyenne : 296 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Bonne Anse, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Bonne Anse, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Bonne Anse, 2025)




Saison 1 : Pas de commentaire.
Saison 2 : Pas de commentaire.
Saison 3 : Coef marée 68, vent O km/h. Le site de prélèvement a été déplacé de 100/200 m en amont suite à l'érosion de la dune.
Saison 4 : Coef marée 85, vent 30 km/h avec des rafales SO à 45 km/h. Beaucoup de précipitations les jours précédents. Le site de prélèvement a été déplacé de 200/300 m en amont suite à l'érosion de la dune.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 96 fragments

Abondance médiane : 5 fragments/100 m

Abondance moyenne : 24 fragments/100 m




POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 3 boulettes

Abondance médiane : 0,01 boulette/m

Abondance moyenne : 0,01 boulette/m

Répartition sur l'année >



Paraffines et assimilés
Hydrocarbures
Autres polluants

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LA CORNERIE (Fouras, 17)

ID FR038
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2016 par l'association T.E.O. (fréquence trimestrielle)

Cordon de galets et de sédiments mixtes, en appui sur une dune. Site en zone naturelle, classé ZNIEFF (type II), SIC et ZPS (Natura 2000).






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 809 déchets

Abondance médiane : 190 déchets/100 m


Abondance moyenne : 202 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Cornerie, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Cornerie, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Cornerie, 2025)




Saison 1 : Coef marée 32, vent SO 30 km/h. Pas de commentaire.
Saison 2 : Coef marée 95, vent E 35 km/h. Pas de commentaire.
Saison 3 : Coef marée 57, vent O 17 km/h. Pas de commentaire.
Saison 4 : Coef marée 90, vent SE 18 km/h. Un ramassage de déchets semble avoir été réalisé avant le prélèvement. Aucun déchet n'a été collecté sur le site et un amas de déchets a été constitué à proximité.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 76 fragments

Abondance médiane : 6 fragments/100 m

Abondance moyenne : 19 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 0 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LA MAISON DE GRAVE (Le Verdon sur Mer, 33)

ID FR041
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2019 par le CPIE Médoc
(fréquence trimestrielle)

Plage de sable bordant un massif dunaire. Site en zone naturelle, classé ZNIEFF (type II), SIC et ZSC (Natura 2000) et faisant partie du parc naturel régional du Médoc et du conservatoire du littoral de la Dune de Grave.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1279 déchets

Abondance médiane : 150 déchets/100 m


Abondance moyenne : 321 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Maison de Grave, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Maison de Grave, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Maison de Grave, 2025)



Saison 1 : Pas de commentaire.
Saison 2 : Coef marée 69, vent O 15 km/h. Pas de commentaire.
Saison 3 : Coef marée 78, vent NO 14 km/h. Fréquentation du site importante la veille, de nombreuses traces de piétinement.
Saison 4 : Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 850 fragments

Abondance médiane : 74 fragments/100 m

Abondance moyenne : 213 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 0 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LA PLAGE DES GROTTES (Jard-sur-Mer, 85)

ID FR051
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2021 par le Groupe Associatif Estuaire (fréquence trimestrielle)

Plage de sable se trouvant à la sortie de l'estuaire du Payré. Site bordé par un massif dunaire végétalisé. Site en zone naturelle, classé ZNIEFF (types I et II), SIC et ZCS (Natura 2000) et faisant partie de l'espace protégé de la pointe du Payré.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 526 déchets

Abondance médiane : 209 déchets/100 m


Abondance moyenne : 176 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Plage des Grottes, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Plage des Grottes, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Plage des Grottes, 1900)



Saison 1 : Coef marée 86. Pas de commentaire.
Saison 2 : Coef marée 74, vent 19 km/h. Pas de commentaire.
Saison 3 : Pas de donnée.
Saison 4 : Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 36 fragments

Abondance médiane : 7 fragments/100 m

Abondance moyenne : 12 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 0 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LA POINTE D'ARÇAY (La Faute-sur-Mer, 85)

ID FR052
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2021 par le Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (fréquence trimestrielle)

Plage de sable située sur la flèche de la pointe d'Arçay. Site est bordé par une dune d'altitude modérée. Site en zone naturelle, classé ZNIEFF (type I), SIC et ZPS (Natura 2000) et faisant partie de l'espace protégé de la Pointe d'Arçay et du Parc naturel régional du Marais Poitevin.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1510 déchets

Abondance médiane : 352 déchets/100 m


Abondance moyenne : 378 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (La Pointe d'Arçay, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (La Pointe d'Arçay, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (La Pointe d'Arçay, 2025)



Saison 1 : Coef marée 86. Pas de commentaire.
Saison 2 : Coef marée 78, vent à 18 km/h. Le poids et le volume des déchets sont grandement augmentés par la présence d'un poteau de bouchot.
Saison 3 : Coef marée 75, vent O, 28 km/h. Pas de commentaire.
Saison 4 : Coef marée 53, vent SO 40 km/h avec rafales à 50 km/h. Peu de déchets collectés du fait des conditions météorologiques et de la tempête Benjamin les jours précédents. Prélèvement réalisé sur 50 m.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 8 fragments

Abondance médiane : 0 fragment/100 m

Abondance moyenne : 2 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 1 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m



MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LES SELLIERS (Marsilly, 17)

ID FR035
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2018 par l'association T.E.O. (fréquence trimestrielle)

Cordon de galets en appui sur un enrochement longitudinal. Site en zone semi-urbanisée, classé ZNIEFF (types I et II), SIC et ZPS (Natura 2000) et faisant partie de l'espace protégé de la Baie de l'Aiguillon.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1370 déchets

Abondance médiane : 339 déchets/100 m


Abondance moyenne : 343 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (Les Selliers, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Les Selliers, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Les Selliers, 2025)



Saison 1 : Coef marée 32, vent SO 30 km/h. Pas de commentaire.
Saison 2 : Coef marée 95, vent E 35 km/h. Pas de commentaire.
Saison 3 : Coef marée 57, vent O 17 km/h. Pas de commentaire.
Saison 4 : Coef marée 90, vent SE 18 km/h. Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 116 fragments

Abondance médiane : 1 fragment/100 m

Abondance moyenne : 29 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 0 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

LES TROIS PIERRES (Saint-Denis-d'Oléron, 17)

ID FR039
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2017 par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) (fréquence trimestrielle)

Cordon de galets en appui sur une dune. Site en zone semi-urbanisée, classé ZNIEFF (type I) et SIC (Natura 2000).






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1167 déchets

Abondance médiane : 290 déchets/100 m


Abondance moyenne : 292 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (Les Trois Pierres, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Les Trois Pierres, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Les Trois Pierres, 2025)



Saison 1 : Coef marée 83, vent E très légère brise. Pas de commentaire.
Saison 2 : Coef marée 74, absence de vent. Pas de commentaire.
Saison 3 : Coef marée 80, vent O 20 km/h. Pas de commentaire. Pas de commentaire.
Saison 4 : Coef marée 80, vent O 20 km/h. Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 26 fragments

Abondance médiane : 3 fragments/100 m

Abondance moyenne : 7 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 2 boulettes

Abondance médiane : 0,01 boulette/m

Abondance moyenne : 0,01 boulette/m

Répartition sur l'année >



MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

MOËZE-OLÉRON (Saint-Froult, 17)

ID FR053
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2020 par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron (fréquence trimestrielle)

Plage de sable située sur une côte basse. Site bordé par un enrochement longitudinal avec en arrière la présence de marais littoraux. Site classé ZNIEFF (types I et II), SIC et ZPS (Natura 2000) et faisant partie du Marais de Moëze Brouage et de la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron.






ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 773 déchets

Abondance médiane : 194 déchets/100 m


Abondance moyenne : 193 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (Moëze-Oléron, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Moëze-Oléron, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Moëze-Oléron, 2025)




Saison 1 : Coef marée 68, vent E 8 km/h. Pas de commentaire.
Saison 2 : Pas de commentaire.
Saison 3 : Pas de commentaire.
Saison 4 : Coef marée 43, vent NNE 5 km/h. Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 12 fragments

Abondance médiane : 0 fragment/100 m

Abondance moyenne : 3 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 1 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

Répartition sur l'année >



MACRODÉCHETS SUR LE LITTORAL

SYNTHÈSE
2025

Analyse réalisée par le CEDRE
Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique et polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.

DESCRIPTIF DU SITE

PORT NOTRE DAME (Sainte-Marie-de-Ré, 17)

ID FR037
DCSMM : Sous-région marine Golfe de Gascogne
OSPAR : Région IV. Golfe de Gascogne et côte ibérique

Suivi réalisé depuis 2018 par la Communauté de communes de l'Île de Ré (fréquence trimestrielle)

Plage de sable et de galets bordant un massif dunaire. Site en zone naturelle, classé SIC et ZSC (Natura 2000).




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE
hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 300 déchets

Abondance médiane : 66 déchets/100 m


Abondance moyenne : 75 déchets/100 m



TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques


Composition des déchets (Port Notre Dame, 2025)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Port Notre Dame, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)



ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Port Notre Dame, 2025)



Saison 1 : Coef marée 93, vent NE 30 km/h. Vent fort et pluie importante quelques jours avant le suivi.
Saison 2 : Coef marée 80, vent SO 45 km/h. Pas de commentaire.
Saison 3 : Coef marée 69, vent O 25 km/h. Pas de commentaire.
Saison 4 : Coef marée 79, vent SO 25 km/h. Tempête la veille du prélèvement avec des rafales à plus de 90 km/h.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 31 fragments

Abondance médiane : 3 fragments/100 m

Abondance moyenne : 8 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 1 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m

